

**MANOEL CLÁUDIO DA SILVA JÚNIOR
ROBERTA MARIA COSTA E LIMA**

100

**ÁRVORES URBANAS
BRASÍLIA
Guia de Campo**



61 - *Tabebuia heptaphylla* - Bignoniaceae

Ipê-roxo-de-sete-folhas

Árvores (5) de até 35m de altura; sem **exsudação** ao se destacarem as folhas. **Copa** com gemas e ramos terminais pilosos de cor cinza ou amarelada. **Troncos** com diâmetros de até 80cm; **ritidoma** (6) acinzentado; fissurado com veios amarelados. **Folhas** (3) compostas, digitadas; opostas, cruzadas; 5 a 7 folíolos; lanceolados a estreito-elípticos; até 15cm de compr. e 5cm de larg., folíolos terminais maiores; ápices obtusos a arredondados e bases arredondadas a agudas; margens serreadas; **nervação** (4) broquidódroma, nervura central amarelada, saliente na face inferior, nervuras secundárias pouco evidentes na face inferior; pecíolos com base inflada, até 33cm de compr., peciólulos de até 4cm de compr., com inserção articulada; folíolos coriáceos; discolores; pilosos. **Inflorescências** (1) tirsóides, até 9cm de compr.; até 40 flores. **Flores** (1) até 6cm de diâmetro; com cinco pétalas fundidas em tubo; de cor arroxeadas a rosadas. **Frutos** (2) síliquas de até 40cm de compr.; glabros, quase negros quando maduros. **Sementes** até 1cm de compr.; aladas; muitas por fruto.

Habitat e distribuição - originária da América do Sul, onde está amplamente distribuída, desde as Guianas até a Argentina. No Brasil, desde o sul da BA até SP. Não amostrada em 39 superquadras inventariadas no Plano Piloto em Brasília.

Fenologia e reprodução - árvore decídua; **floração**: junho a setembro; **polinização**: abelhas grandes; **frutificação**: agosto a novembro; **dispersão**: vento; **sementes**: 29.000/kg; **germinação**: taxa elevada, em até 15 dias.

Usos - utilizada na arborização pela beleza de sua floração. A madeira castanha, de alta qualidade, 1,03g/cm³, tem ampla aplicação. Na medicina popular a casca do tronco é usada como cicatrizante, para a pele, úlceras, diabetes e câncer. Alguns usos têm comprovação científica.

Etimologia - *Tabebuia*: do tupi, pau que flutua, ou pau-de-formiga. *Heptaphylla*: folhas com até sete folíolos. *Ipê*: do tupi, que significa casca, ou árvore da casca.

Sinonímia: *Handroanthus heptaphyllus*.



1 [MC]



2 [MC]



3 [EL]



4 [MC]



5 [MC]



6 [MC]